reçu le 9. fev.r 1764

par M. Dufour lieutenant du 1.er chir. du roi à Martel en quercy.

Observation

sur un depot situé entre le diaphragme et la plevre

N.° 109.

Le 27. janvier 1763 je fus appellé par Monsieur Molinie avocat de la paroisse de Creissensac en quercy pour madame son epouse: et Monsieur son fils docteur en medecine me dit qu'elle etoit malade depuis six semaines d'une fievre continue avec redoublement, et d'une douleur insupportable a la partie superieure de la region epigastrique, et qu'on craignoit qu'il ne s'y format un abcés.

Apres avoir fai plusieurs questions a la malade, j'appris qu'elle n'avoit pas voulu être saignée. j'apperçus au dessous du cartilage xiphoide une petite rougeur, ou elle sentit une douleur plus vive qu'à l'ordinaire quoique je l'eusse touchée legerement. j'appliquai dessus un Cataplasme anodin et maturatif et fis saigner la malade nonobstant sa grande repugnance pour cette operation. elle ne reposoit ni jour ni nuit, et ne pouvoit faire aucun mouvement, pas même celui de la deglutition des alimens sans sentir les plus vives douleurs. Les medecins et chirurgiens qui l'avoient vue, avoient annoncé que la suitte de cette maladie seroit tres dangereuse; mais au lieu de cette prediction s'ils avoient fait leur possible pour surmonter la pusilanimité de la malade pour la saignée, et qu'elle eut eté repetée suivant les circonstances, elle auroit vraisemblablement appaisé la douleur et terminé la maladie.

L'usage des Cataplasmes Contribuat à faire manifester une tumeur d'une figure oblongue, qui êtant située traversalement a la region epigastrique, s'etendoit jusqu'aux

ARC 39 n° 39

Cartilages des fausses Côtes.

Le cinquieme jour ayant un peu senti la fluctuation de la matiere, j'annonce aux parents la necessité qu'il y avoit de ne point la laisser sejourner plus long temps; et aprés avoir determiné la malade a l'operation je fis une incision selon la rectitude des fibres, de l'etendue de deux pouçes qui donna issue a du pus un peu sanguinolent. j'observois qu'il venoit de loint, que les mouvements de la respiration en facilitoit la sortie par deux sinus, un de chaque côté du cartilage Xiphoide: la sonde entra dans le gauche de la longueur d'un pouce et demi Et dans le droit de trois pouces et demi; l'un et l'autre communiquoit dans un seul foyer qui selon sa position devoit être situé entre la pleure et le diaphragme. j'agrandis les ouvertures de ses sinus par leur partie superieure jusqu'aux cartilages des côtes pour la facilité des pansements et la sortie de la matiere.

Je mis en usage des injections legerement vulneraires et detersives pendant douze jours et jusqu'a ceque la matiere eut acquis une bonne qualité. le reste de la playe fut pansée avec un digestif.

Le Regime fut sever et varié ainsi que les pansements — suivant les circonstances. la malade fut de mieux en mieux; la fievre la quitta, et apres un mois et demi de traitement elle se trouva parfaitement guerie et jouit a present d'une parfaite santé.